Afta® med

Allevia il dolore e promuove la guarigione delle afte riducendone la durata, grazie alla sua azione protettiva
Non contiene alcool

L'afta è una condizione infiammatoria caratterizzata dalla comparsa di lesioni ulcerose dolorose nel cavo orale. Aftamed, con la sua formulazione brevettata, fornisce una protezione duratura sulla lesione consentendo un'immediata riduzione del dolore, come dimostrato da studi clinici controllati, e aiuta ad accelerare i naturali processi di guarigione, riducendo il numero delle lesioni e reidratando i tessuti.

Indicazioni
Afte
Stomatiti aftose
Lesioni ulcerose ricorrenti del cavo orale (ulcere ricorrenti e lichen planus)
Irritazioni del cavo orale

Modalità d'uso
GEL / GEL JUNIOR: applicare 2-3 volte al giorno, o più secondo necessità, dopo i pasti, per una settimana o fino alla scomparsa dei sintomi.

FORTE: formula ad alta densità e concentrazione specificamente studiata per afte estese e molto dolorose. Applicare la giusta quantità di prodotto sulla lesione.
Per lesioni molto estese aver cura di coprire l'intera superficie dell'ulcera.
Ripetere l'applicazione 2-3 volte al giorno, o più secondo necessità, dopo i pasti, per una settimana o fino alla scomparsa dei sintomi.

COLLUTORIO: Nel caso di ulcere ricorrenti l'uso continuativo del collutorio può favorire un'azione preventiva sull'intero cavo orale.
Effettuare uno sciacquo con 10ml di prodotto 2-3 volte al giorno, o più secondo necessità, dopo i pasti, per una settimana o fino alla scomparsa dei sintomi.
Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire.

SPRAY: Applicare 2-3 volte al giorno, o più secondo necessità, dopo i pasti, per una settimana o fino a scomparsa dei sintomi.

In caso di dolore persistente, il prodotto può essere applicato con sicurezza anche più volte al giorno.
Si consiglia di non mangiare e bere per almeno 30 minuti dopo l'applicazione.
A seguito di accidentale ingestione del prodotto non sono stati riportati problemi.

Composizione
GEL
Principali componenti: Acido Ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare
Altri componenti: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium hydroxide, Dichlorobenzyl alcohol, Aroma, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090). Può contenere: Lactic acid.

GEL JUNIOR
Principali componenti: Acido Ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare
Altri componenti: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 hydrogenated castor oil, Glyceryl laurate, Polysorbate 20, Aroma, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium lactate, Lactic acid, Disodium EDTA.
Può contenere: Sodium Hydroxide.

FORTE
Principali componenti: Acido Ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare
Altri componenti: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl alcohol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, PVP, Cellulose gum, Sodium benzoate, Sodium hydroxide, Carbomer (Polycarbophil), Sodium phosphate, Aroma, Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090). Può contenere: Lactic acid.

COLLUTORIO
Principali componenti: Acido Ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare
Altri componenti Aqua, Xylitol, Propylene glycol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Carbomer (Polycarbophil), Dichloro-benzyl alcohol, Sodium lactate, Aroma, Lactic acid, Disodium EDTA, Sodium hydroxide, Sodium saccharin, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).

SPRAY
Principali componenti: Acido Ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare
Altri componenti: Aqua, Xylitol, Propylene glycol, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Aroma, Dichlorobenzyl alcohol, Sodium lactate, Sodium hydroxide, Lactic acid, Polyvinyl alcohol, Disodium EDTA, Sodium saccharin.

Avvertenze
Evitare l'uso in caso di ipersensibilità individuale verso gli ingredienti.
Evitare l'uso se il prodotto appare visibilmente danneggiato. Qualora i sintomi persistano consultare il proprio medico. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Il periodo di validità si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Dopo l'uso, eliminare eventuali residui di prodotto dal contenitore prima di richiuderlo. Questo prodotto è per uso personale. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Confezioni
- AFTAMED GEL tubo
- AFTAMED GEL JUNIOR tubo
- AFTAMED GEL FORTE tubo
- AFTAMED COLLUTORIO flacone con misurino CE 0373
- AFTAMED SPRAY flacone con erogatore

Bioplax Italia Srl
Via G. Leopardi, 21
20123 Milano - Italy
www.bioplaxpharma.com

CE 0051 +40°C +5°C

AF4001-04/C/A V1
Revisione Giugno 2023

Distributore: A. Menarini
Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi, 3 - Firenze

GEL - GEL JUNIOR - GEL FORTE

ASTUCCIO	FOGLIETTO	TUBO	CANNULA	TAPPO
PAP 21	PAP 22	HDPE 02 LDPE 04	LDPE 04	LDPE 04
CARTA		PLASTICA		
RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE				

SPRAY

ASTUCCIO	FOGLIETTO	FLACONE	EROGATORE	POMPA
PAP 21	PAP 22	PET 01	C/PP 92	C/PP 92
CARTA		PLASTICA		
RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE				

COLLUTORIO

ASTUCCIO	FOGLIETTO	MISURINO	TAPPO	FLACONE
PAP 21	PAP 22	HDPE 02 PP 05	HDPE 02 PP 05	PET 01
CARTA		PLASTICA		
RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE				

A. MENARINI