

VIVIN TOSSE PEDIATRICO

DISPOSITIVO MEDICO (classe IIa) a base di Piantaggine, Altea e Miele

1 flacone da 150 ml e con misurino dosatore CE 0373 Misurino dosatore prodotto da Bormioli Pharma S.p.A, Corso Magenta 84, Milano (MI) Italia

INDICAZIONI:

VIVIN TOSSE PEDIATRICO è un dispositivo medico a base di estratti naturali e miele, in grado di creare un film protettivo che calma la tosse proteggendo le prime vie aeree.

Grazie alla presenza di estratti naturali di dimostrata efficacia **VIVIN TOSSE PEDIATRICO** agisce creando una barriera protettiva che limita il contatto delle vie respiratorie con gli agenti esterni ad azione irritante, migliorando la funzionalità delle prime vie respiratorie, soprattutto nei periodi invernali, o quando fenomeni irritativi dovuti ad agenti esterni (freddo, smog, polvere e fumo), lo rendono necessario.

MECCANISMO D'AZIONE:

VIVIN TOSSE PEDIATRICO promuove la protezione e l'idratazione della mucosa faringea:

- in caso di **TOSSE GRASSA** promuove l'idratazione del muco e ne favorisce l'espulsione.
- in caso di **TOSSE SECCA** protegge la mucosa faringea dagli agenti irritanti svolgendo azione lenitiva sulla mucosa irritata.

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

PER BAMBINI DAL 1° ANNO DI ETÀ

AL PIACEVOLE GUSTO FRAGOLA E CREME CARAMEL

ADATTO A VEGETARIANI

COMPOSIZIONE: Miele di Fiori (30 g), Altea (*Althaea officinalis* L., radici) estratto su supporto di maltodestrine (1,50 g), Piantaggine (*Plantago Lanceolata* L., foglie) estratto su supporto di maltodestrine (4,50 g), Gomma Xantana E415 (0,30 g), Fruttosio, aroma Fragola, aroma Creme Caramel, Potassio Sorbato E202, Acido citrico E330, Acqua Depurata.

POSOLOGIA E ISTRUZIONI PER L'USO:

Bambini 1-2 anni: 5 ml 2 volte al giorno

Bambini 3-4 anni: 5 ml 3 volte al giorno

Bambini 5-10 anni: 10 ml 2 volte al giorno

Assumere preferibilmente lontano dai pasti. Agitare il flacone prima dell'uso. Lavare accuratamente il misurino dopo l'uso. Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso

AVVERTENZE:

- Nei bambini al di sotto dei 3 anni, se i sintomi persistono e peggiorano dopo 2 giorni di trattamento, consultare il medico.
- Se non si notano miglioramenti apprezzabili dopo 7 giorni, contattare il proprio medico, in ogni caso non utilizzare per più di 15 giorni.
- Non assumere se si è allergici, intolleranti o ipersensibili a qualche componente.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è destinato.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
- Non sono stati osservati effetti collaterali associati all'uso del dispositivo. Se si nota la comparsa di effetti collaterali, informare il medico.
- In caso di trattamento farmacologico concomitante, sebbene non siano note interazioni con farmaci, si consiglia di consultare il medico prima dell'uso.
- Non superare la dose giornaliera raccomandata.
- Qualsiasi incidente grave correlato o concomitante all'uso del dispositivo deve essere immediatamente segnalato al Fabbricante e all'Autorità competente.
- In caso di qualsiasi evento indesiderato, consultare sempre un medico.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce. Il periodo di validità dopo la prima apertura dello sciroppo è di 3 mesi.

Rev: Marzo 2025



MD
Dispositivo
medico

LOT
Cod lotto:

Da utilizzare
entro
AAAA-MM

UDI
Unique
Device
Identifier

Consultare
le istruzioni
di utilizzo

Non
utilizzare se
l'imballo non
è intatto

Distributore Fabbricante

REF FTPR38



A. MENARINI

Labomar S.p.A., Via N. Sauro 35 I Istrana (TV)

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi, 3 - Firenze

7F6L00212100